

ОСТАНОВИТЬ COVID-19



ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ?



В медицинских
учреждениях
по всей области



ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ НЕОБХОДИМО:

1. Заполнить анкету и согласие.
2. Пройти осмотр врача

ПЕРИОД ВАКЦИНАЦИИ



После введения вакцины:
Соблюдать рекомендации врача
Следить за самочувствием



Вторая доза вводится на 21 день
После формируется устойчивый
иммунитет, который может
сохраняться до 2-х лет

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ – ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА!



БОЛЕЗНЕННОСТЬ,
ОТЁЧНОСТЬ,
ПОКРАСНЕНИЕ
В МЕСТЕ УКОЛА



ПЕРШЕНИЕ
В ГОРЛЕ



ГОЛОВНАЯ
БОЛЬ



КРАТКОВРЕМЕННОЕ
ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ЗАЛОЖЕННОСТЬ
НОСА

ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫ СЛАБОСТЬ, БОЛЬ В МЫШЦАХ И СУСТАВАХ

ДАННЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПРЕПАРАТА
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ВТОРОГО ЭТАПА ВАКЦИНАЦИИ.

ВАЖНО!
СОБЛЮДАТЬ ВСЕ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
ДО И ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ:
НОСИТЬ МАСКУ,
ПЕРЧАТКИ,
СОБЛЮДАТЬ
СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ

